

CE QUE VOUS DEVEZ  
SAVOIR

## LES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES

**MediSystem™**  
Pharmacy  
A SHOPPERS DRUG MART COMPANY



## BACTÉRIURIE ASYMPTOMATIQUE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES

Le traitement de la bactériurie asymptomatique ne diminue pas le risque d'une infection urinaire symptomatique; toutefois, il peut augmenter le risque d'effets indésirables et la résistance aux médicaments.

Il y a une prévalence élevée de bactériurie asymptomatique chez les personnes âgées. Chez les adultes de plus de 70 ans :

- Dans la communauté – jusqu'à 19 %
- Dans les soins de longue durée – jusqu'à 50 %
- Chez les personnes ayant un cathéter à demeure de longue durée – 100 %

Le dépistage régulier et le traitement ne sont PAS recommandés pour la bactériurie asymptomatique (exception : les gens suivant un traitement génito-urinaire ou ayant une prothèse et les personnes immunovulnérables).

Une analyse d'urine positive en l'absence de symptômes n'indique PAS une infection.

Des changements dans l'urine (odeur, opacité) ou dans l'état mental seul (sans symptômes localisés) n'indiquent PAS une infection urinaire.

**Quoi chercher...** (chez les pensionnaires sans cathéter urinaire à demeure).

L'un des éléments suivants :

- Une douleur aiguë lors de la miction ou une douleur aiguë, une enflure ou une sensibilité au niveau des testicules, de l'épididyme (le tube à l'arrière des testicules) ou de la prostate;
- De la fièvre, des frissons ou un dénombrement élevé de globules blancs (leucocytes au-dessus de la plage normale) et au moins l'un des éléments suivants :
  - une nouvelle fréquence, urgence, incontinence ou une augmentation de la fréquence, de l'urgence ou de l'incontinence urinaire,
  - présence anormale de globules rouges dans l'urine,
  - une nouvelle douleur au flanc ou douleur/sensibilité suspubienne;
- Au moins deux des symptômes suivants ou plus :
  - une nouvelle fréquence, urgence, incontinence ou une augmentation de la fréquence, de l'urgence ou de l'incontinence urinaire,
  - présence anormale de globules rouges dans l'urine,
  - une nouvelle douleur au flanc ou douleur/sensibilité suspubienne.

### SOURCES :

www.rxfiles.ca – Urinary Tract Infections (UTI) in Older Adults. Rowe, TA and Juthani-Mehta, M. Urinary tract infection in older adults. Aging health. 2013 October; 9(5).  
www.merckmanuals.com